

463

4032

c IV.

Séance du 12 Juillet 1911.

N° 7.

JEAN P. CARDAMATIS et APOLLODORE MELISSIDIS



Deux cas de bouton d'Orient, dont le
premier très rare ; antagonisme probable
entre le bouton d'Orient et le Kala-azar

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welTROmec
Call	Pam
No.	WR 350
	1911
	C26d2

EXTRAIT

DU

Bulletin de la Société de Pathologie Exotique



PARIS

MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, Boulevard Saint-Germain (6^e)



22200132350



Deux cas de bouton d'Orient, dont le premier très rare ; antagonisme probable entre le bouton d'Orient et le Kala-azar

Par JEAN P. CARDAMATIS et APOLLODORE MELISSIDIS.

Tout le monde sait que le bouton d'Orient est rarement isolé ; il y en a souvent plusieurs sur le même individu : deux ou trois et plus encore. Mais les cas de vingt sont rares. LAVERAN, en Algérie, et KALAÏSSAKIS, en Crète, ont observé, chacun de leur côté, jusqu'à quarante boutons sur un même individu, ce qui est tout à fait exceptionnel et l'on peut considérer comme uniques les cas de BARBE (soixante boutons sur un individu) et de LEMASKY (cinquante à cent!!).

Il s'ensuit que notre cas d'un jeune homme portant trente-cinq boutons, dont vingt-quatre sur le visage, est rare ; nous sommes heureux de pouvoir accompagner notre description de photographies montrant les ravages causés par le mal.


Jean EPITROPAKIS, âgé de seize ans, cordonnier et domicilié à Héraclée, en Crète, se rendit en novembre 1910, dans son village de Péra du département d'Héraclée où il demeura quinze jours dans sa famille, composée de huit personnes toutes d'une santé parfaite. Dans ce village, d'après les renseignements fournis par lui-même, et pendant son séjour, il y avait plusieurs personnes atteintes du bouton d'Orient, mais il ne fut en relation avec aucune d'elles.

Un mois environ après son retour à Héraclée parurent chez lui les premiers boutons sur la protubérance droite du front ; dès lors les boutons grossirent et se multiplièrent et il lui en vint aux bras et aux mains.

Nous avons examiné le cas le 12 avril dernier et avons observé qu'il avait trente-cinq boutons assez développés au visage et aux bras : trente-trois étaient ulcérés et deux ne l'étaient pas ; leur dimension variait : les uns étaient de la grosseur d'un pois chiche et les autres de celle d'une pièce de cinquante centimes à un franc.

Le tableau suivant indique le nombre, la position, la nature et la dimension des boutons :

Nombre	Position	Nature	Dimension
1°) <i>Vingt-quatre sur le visage.</i>			
2	à la protubérance frontale droite	tous deux en partie ulcérés	L'un d'une pièce de 50 cent., l'autre d'une pièce d'un franc
6	à la joue droite	tous ulcérés	d'une pièce de 50 cent. à celle d'un franc
2	à la région parotide droite	l'un ulcéré, l'autre non (jeune bouton)	l'un d'une pièce de 50 cent., l'autre d'un pois chiche
3	au pavillon de l'oreille droite	un peu ulcérés, couverts de squames blanchâtres	d'un pois chiche à une pièce de 50 cent.
3	à la lèvre supérieure, dont deux sur la muqueuse	tous ulcérés	d'une pièce de 50 cent. à un franc
1	au bord de la paupière supérieure de l'œil gauche		d'un pois chiche
4	à la joue gauche	tous ulcérés	d'un haricot à celle d'un franc
1	au menton	ulcéré	d'une pièce de 50 cent.
2	au pavillon de l'oreille gauche	ulcérés	petits
2°) <i>Quatre au bras droit et à la main.</i>			
1	à l'extrémité de l'humérus (poignet)	ulcéré	d'une pièce d'un franc
2	à la surface dorsale du métacarpe	ulcérés	»
1	à la première phalange de l'auriculaire	ulcéré	d'un haricot
3°) <i>Sept au bras gauche et à la main :</i>			
5	à l'avant-bras	dont quatre ulcérés	d'un haricot à celle d'un franc
2	à la surface dorsale de la première phalange du médus	ulcérés	d'une pièce de 50 cent.



Malgré tous ces boutons, le jeune homme n'accuse aucun des symptômes pathologiques des différents systèmes ou des viscères :

Observations hématologiques.

Pour les observations hématologiques nous avons pris du sang :

- 1° de la zone congestive de la périphérie du jeune bouton non ulcérée ;
 - 2° de la zone congestive de la périphérie du jeune bouton ulcéré ;
 - 3° du centre du jeune bouton pas encore ulcéré ;
 - 4° du doigt de la main ;
- et avons obtenu les résultats suivants :

1° *De la zone congestive de la périphérie du jeune bouton non ulcéré .*

Mononucléaires	{grands	25 %	} = 62%
	{intermédiaires	25 %	
	{petits	12 %	
Polynucléaires neutrophiles		35 %	= 35 %
Eosinophiles		3 %	= 3 %

2° *De la zone congestive de la périphérie du jeune bouton ulcéré :*

Mononucléaires	{grands	25 %	} = 59 %
	{intermédiaires	17 %	
	{petits	17 %	
Polynucléaires neutrophiles		39 %	= 39 %
Eosinophiles		2 %	= 2 %

3° *Du centre du jeune bouton non ulcéré :*

Mononucléaires	{grands	11 %	} = 77 %
	{intermédiaires	30 %	
	{petits	36 %	
Polynucléaires neutrophiles		22 %	= 22 %
Eosinophiles		1 %	= 1 %

4° *Du doigt de la main :*

Mononucléaires	{grands	10 %	} = 28 %
	{intermédiaires	12 %	
	{petits	6 %	
Polynucléaires neutrophiles		70 %	= 70 %
Eosinophiles		2 %	= 2 %

Observations microscopiques. — Pour les observations au microscope, nous avons pris différentes séries de préparations et avons observé :

1° Dans celles de pus pur qui se trouvait sous les croûtes, nous avons trouvé une grande quantité de corpuscules de *Leishmania* dans presque toutes les cellules épithéliales. Beaucoup de ces parasites étaient libres, oblongs, piriformes, ovoïdes ou même sphériques avec un protoplasme fin, mais bien coloré ;

2° Dans celles de pus mêlé de sang, nous avons trouvé relativement moins de corpuscules, dont la plupart étaient libres ; quelques-uns avaient le protoplasme tellement fin qu'il était à peine coloré ;

3° Dans celles de la sérosité, nous avons trouvé également un assez grand nombre de parasites libres, plutôt piriformes ;

4° Dans celles de la sérosité mêlée de sang, nous avons trouvé moins de corpuscules ;

5° Dans celles de sang pris dans la zone congestive d'un bouton ulcéré, nous avons trouvé de rares parasites isolés piriformes ;

6° Dans celles de sang pris dans la zone congestive d'un bouton non ulcé-

